효능·효과

비타민 B12 결핍으로 인한 거대적아구성 빈혈과 관련된 다발성신경염의 치료

용법·용량

성인 : 히드록소코발라민으로서 1일 1회 5,000ug을 근육주사 또는 정맥주사한다.
임상적 반응에 따라 저용량으로 치료를 지속한다.

'히드록소코발라민' 성분제제 변경대비표

항 목	기 허 가 사 항	변 경 사 항
효능·효과	1. 다음 질환에도 사용할 수 있다. 급성신경염, 다발성 신경염, 좌골신경통, 류마티양 경견완증후군, 척수근통, 견갑관절주위염, 위염, 암 및 외상에 의한 신경통, 대상포진 및 편두통에 의한 신경통	**비타민 B12 결핍으로 인한 거대적아구성 빈혈과 관련된 다발성신경염의 치료**
용법·용량	성인 : 히드록소코발라민으로서 1회 5000 마이그로그람, 1일 1회 근육주사 또는 정맥주사한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.	성인 : 히드록소코발라민으로서 1일 1회 5,000ug을 근육주사 또는 정맥주사한다. **(삭제)** ~~연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.~~ **임상적 반응에 따라 저용량으로 치료를 지속한다.**